

เน่าคออ้อย (แบคทีเรียโอซีส)

เชื้อสาเหตุ

Erwinia carotovora แบคทีเรีย

อาการ

ในระยะแรกอ้อยจะแห้งตายเป็นบางหน่อ ระยะหลังลำอ้อยบริเวณคอเน่าจนคอหักพับ มีกลิ่นเหม็นเน่า เนื้อในอ้อยยุบเป็นโพรงเห็นเนื้อเป็นเส้น

วิธีการแพร่ระบาด

ติดไปกับท่อนพันธุ์ ลมและฝนพัดพาเชื้อจากต้นที่เป็นโรคไปติดต้นข้างเคียง

วิธีการป้องกันรักษา

พบกอเป็นโรคให้ตัดออกทำลาย พ่นสารเคมีแอกกรีไมซินบนกอที่ตัดทิ้งและบริเวณรอบ ๆ กอ

สภาพแวดล้อมที่

พบกอเป็นโรคให้ตัดออกทำลาย พ่นสารเคมีแอกกรีไมซินบนกอที่ตัดทิ้งและ

เหมาะสมในการแพร่

บริเวณรอบ ๆ กอ

ระบาด

พาหะนำโรค

ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค ลม ฝน



ที่มา :: คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย